



► *Xenasma pruinosum* (Pat.) Donk



Bois

1

2

3

4

1 : Spores elliptiques, 6-7 x 3,5-4 µm, très finement verruqueuses, lisses, hyalines, non amyloïdes.

2 : Pleurobasides subcylindriques comportant de 4 à 6 stérigmates.

3 : Cystidioles capitées avec des protubérances, de 3 à 4 µ d'épaisseur.

4 : Cystides saillantes, tubulaires, de 50 à 100 µ de long, à parois minces.

Charme

Fructifications résupinées, minces, très adhérentes au substrat. Hyménium hyalin à gris bleu sur le frais, lisse à +/- tuberculeux, farineux-pruineux sous la loupe (par la présence de cystides), à marge indéterminée. Consistance céracée à gélatineuse sur le frais, cornée à l'état sec. Habitat sur bois pourri de feuillus.

A l'envers d'une branche de charme, à terre.
Combe Vanoche, maille 3023D14, le 30 janvier 2018

Rare

► Espèce mince et difficile à repérer sur le terrain, caractérisée par sa consistance céracée sur le frais et par la couleur gris bleuté de l'hyménium. Le microscope permet d'observer des pleurobasides comportant plus de 4 stérigmates, des cystides tubulaires clairsemées mais bien visibles et des spores minutieusement verruqueuses de lecture plutôt difficile.