

► *Bolbitius lacteus* Lange




Leg. JCV & det. JCV

Pelouse

Xero-
bromion

Peu
fréquent



1

1 : Spores elliptiques à ovoïdes, pore large, 9-11 x 5-6,5 µm.
Cheilocystides lagéniformes à subutriformes, 20-35 x 10-15 µm,
caulocystides semblables, 30-50 x 10-15 µm. Boucles rares.

Chapeau 1-1,5 cm, assez haut et presque en doigt de gant puis campanulé et enfin plan convexe, marge striée à cannelée, revêtement lubrifié, blanc puis blanc ocracé, ocracé grisâtre pâle vers la marge. Lames étroites, libres, moyennement serrées, crème puis rousses. Stipe élancé, flexueux, finement squamuleux (loupe), 2-4 x 0,1-0,2 cm, blanc à crème.

Çà et là dans la pelouse (*Xerobromion*).

Brochon, Champ Sement, maille 3023D21, le 4 juin 2018.

► Bien que sa consommation soit peu probable en raison de sa petite taille, *Bolbitius lacteus* est non comestible, voir légèrement vénéneux ! Espèce très facile à confondre avec *Bolbitius tener* (= *Conocybe lactea*) qui a un chapeau peu ou non lubrifié, s'ouvrant moins, des caulocystides lécithiformes et des spores plus grandes.