



# ► *Gymnopus quercophilus*

(Pouzar) Antonín & Noordel.



Leg. JCV & det. JCV

Forêt

Feuilles de chêne

Peu fréquent

1 : Spores 7-9 x 5 µm, elliptiques à subcylindriques, cheilocystides en brosse.

2 : Piléipellis avec des éléments bi- ou trilobés avec une structure du type *ramealis*.

Chapeau 0,2-1 cm, hémisphérique puis plan-convexe, lisse, centre un peu déprimé, marge crénelée striée par transparence, blanchâtre, crème à centre brun rosé ocracé pâle. Lames adnées, peu serrées, blanchâtres. Stipe filiforme, pruineux à velouté, 2-4 x 0,02-0,05 cm, crème ocracé au sommet, brun rouge foncé à la base. Chair mince, blanchâtre.

Sur feuilles mortes de chêne.

Combe Saint-Martin, maille 3023D12, le 10 juin 2018.

► *Gymnopus quercophilus* (= *Setulipes quercophilus*) peut être confondu avec les véritables *Marasmius* qui poussent aussi sur feuilles mortes : en cas de doute, le microscope est nécessaire, car la cuticule des *Marasmius* est formée de cellules rondes mises côte à côte, ce qui n'est pas du tout le cas chez les *Setulipes*.