



► *Inocybe obsoleta* (Quadr. & Lunghini) Valade



Leg. JCV & det. JCV



Litière



Feuillus



Peu
fréquent

- 1 : Spores elliptiques un peu réniformes, 9-12 x 5-7 µm.
- 2 : Cheilocystides clavées à un peu lagéniformes ou ventrues, 30-65 x 8-15 µm.

Chapeau 2-6 cm, conique, puis convexe avec un mamelon aigu, revêtement soyeux finement poudré de blanchâtre au début, puis finement vergeté ou un peu rimeux d'ocracé sur fond paille jaunâtre plus ou moins grisâtre ou beige ocracé (aspect général pâle). Lames étroitement adnées, gris crème jaunâtre pâle puis gris jaunâtre olivâtre, arêtes plus claires. Stipe plus ou moins clavé, satiné à soyeux, blanc. Chair blanchâtre à ocracé pâle, odeur nulle ou un peu farineuse.

Dans la litière, au bord du sentier.

Combe Chaudron, maille 3023D23, le 17 juin 2018.

► *Inocybe obsoleta* se reconnaît à ses teintes pâles et à son voile parfois tenu mais toujours présent, qui couvre le chapeau chez les jeunes. A chapeau plus nettement jaune : *I. flavella* a un chapeau simplement fibrilleux-rimeux, alors que *I. squamata* et *I. spuria* ont le chapeau nettement écaillieux.