



Leg. JCV & det. JCV

1 : Sporée blanche à crème pâle, I-IIa, spores subglobuleuses à verrues plus ou moins fortes, crêtées, subréticulées (C-2), 9-11 x 7-9 μ m.

2 : Cystides plus ou moins fusiformes, variant de ventruës à cylindracées.

Chapeau 10-15 cm, épais, irrégulier, creusé, marge longtemps enroulée et irrégulière, revêtement un peu ruguleux, blanchâtre puis ocracé sale. Lames, plus larges que la chair du chapeau n'est épaisse, un peu décurrentes, assez épaisses et interveinées, blanchâtres à blanc ivoire. Stipe court, ridulé, 3-6 x 1,5-3 cm, blanchâtre. Chair ferme, blanche un peu brunissante ou roussissante au milieu, odeur fruitée mêlée d'une odeur de " marée " ou de poisson, saveur douce à un peu âcre dans les lames, fer rose pâle lent.

En bordure de sentier, près des chênes.

Le Plain-des-Essoyottes, maille 3023D12, le 19 juin 2018.

► La *Russula delica* ressemble à un vieux *Lactarius vellereus* mais sans lait. *Russula chloroïdes* possède des lames plus serrées, un stipe plus long et une sporée crème. *Russula delica* var. *trachyspora* a un chapeau plus régulier à dépression étroite, revêtement plus lisse et presque brillant, blanchâtre. Comestible.

Lieux
herbeux

Fréquent