



Leg. & det. JCV

Bois mort

1 : Spores 6-9 x 4-6,5 µm, courtement ovoïdes à elliptiques ovoïdes.

2 : Pleurocystides abondantes, très émergentes, 40-100 x 10-25 µm, fusoïdes ventrues à col surmonté de 1 à 5 crochets courbés, à paroi épaisse (jusqu'à 5 µm).

3 : Boucles absentes à toutes les cloisons.

Feuillus

Chapeau 2-15 cm, globuleux puis convexe, glabre ou un peu fibrillo-squamuleux au disque, finement vergeté radialement, beige pâle à brun foncé. Lames écartées du stipe, serrées. Stipe 5-15 x 0,5-3 cm, un peu pruineux à floconneux sous les lames, blanc mais à fibrilles brunes ou au moins brunissantes avec l'âge. Odeur raphanoïde.

Sur une branche morte très dégradée, à terre.
Combe Chaudron, maille 3023D23, le 15 août 2018.

Fréquent

► *Pluteus brunneoradiatus* ressemble à *P. cervinus* mais son chapeau paraît plus brun foncé par des fibrilles radiales brun sombre. La chair à odeur de « linge mouillé », les cystides jusqu'à 80-120 µm et les boucles nulles dans le suprapellis mais présentes aux basides ou aux hyphes hyméniales permettent la différenciation.