



Leg. JCV & det. JCV



1 : Spores hétérodiamétriques à 5-8 angles, 11-12,5 x 7-8,5 µm.  
2 : Cheilocystides lagéniformes à fusiformes ventrues avec un long col.

Chapeau 2-6 cm, convexe puis plan, marge non striée, lisse et un peu vernissé, mastic, beige pâle. Lames échancrées à adnées, blanchâtres puis rose sale à reflets brunâtre pâle. Stipe parfois un peu tordu, fibrilleux à strié longitudinalement, fistuleux, base tomenteuse blanche, 3-8 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre à reflets jaunâtres ou brunâtres. Chair blanchâtre, odeur nulle ou très faible de farine, saveur très faible de farine.

Marais temporaire sur dalle à *Allium schoenoprasum*.  
Le Plain-des-Essoyottes, maille 3023D12, le 13 juin 2018.

► Avec sa silhouette et ses couleurs d'Hébélome, l'Entolome à pied excentré est trompeur, mais une fois qu'il a été correctement placé dans le genre *Entoloma*, son identification est facile. *E. eximium*, très rare et méconnu, lui ressemble un peu, mais son chapeau est conique, et il pousse dans les bois, probablement associé aux charmes. (Eyssartier & Roux, p. 660)

Pelouse sèche

Xero-bromion

Rare