

► *Lycoperdon piriforme* Schaeff.



1

Leg. & det. RRx

Bois mort

1 : Spores rondes, parois épaisses, lisses, brunâtres, guttulées. Ø 3,5-4,5 µm. Capillitium brunâtre, ramifié, parfois bosselé, sans cloisons ni pores.

Fructification 1-5(7) x 1-3,5(5) cm, molle, en forme de poire, couverte de granules labiles laissant vite une surface lisse. Exopérifie gris beige, beige brunâtre, gris jaunâtre et enfin brunâtre, s'ouvrant par un pore sommital large. Un pied net porte à sa base des rhizomorphes (cordons mycéliens) blancs, nombreux et apparents. La chair ou gléba est blanche puis jaune verdâtre et enfin brun olive et pulvérulente.

Sur une vieille souche moussue très décomposée de hêtre.
Source du Rosoir; maille 3022D21, le 26 octobre 2017.

Feuillus

Fréquent

► On trouvera le *Lycoperdon* en forme de poire sur le bois pourri ou les souches en nombreux individus plus ou moins cespiteux et reliés entre eux par les cordons mycéliens. A comparer avec *Lycoperdon perlatum* sans rhizomorphes et à subgléba brun-olive à maturité et *Lycoperdon lividum* à subgléba brun violacé à maturité.