



Leg. & det. RRx.



Herbes

1

2

3

1 : Spores ellipsoïdes ou en citron, verruqueuses, brun-rouge, à paroi épaisse et pore germinatif prohément. 12-16 x 8-12 µm. Sporée noire pourpre.

2 : Basides clavées, tétrasporiques, non bouclées.

3 : Cheilocystides lagéniformes à ventrues, ± sinueuses.

Pelouse

Chapeau 1-2 cm, campanulé et convexe, ne s'étalant pratiquement pas, hygrophane, revêtement lisse, brun rougeâtre, brun de datte, brun tabac, pâlissant par zones concentriques en brunâtre pâle. Lames larges, adnées puis subdistantes, brun grisâtre puis tachées de brun foncé et enfin brunes, arêtes givrées de blanchâtre. Stipe plus ou moins flexueux, fistuleux, sommet pruineux, 4-8 x 0,1-0,2 cm, blanc sale un peu hyalin, brunâtre pâle en bas. Chair brunâtre pâle, blanchâtre sale dans le stipe.

Dans la pelouse humide et fraîchement tondu.

Parking de Jouvence, maille 3022D21, le 13 juin 2018.

Fréquent

► La plupart des *Paneolus* possède des spores lisses. Au contraire, la Panéole des moissons a des spores verruqueuses et *P. olivaceus* présentent des spores rugueuses finement ornémentées. La confusion est donc possible entre ces deux dernières, sauf avec un microscope. Non comestible, voire suspecte à toxique selon certains auteurs.