


► *Stropharia aeruginosa* (Curtis) Quél.



Leg. & det. RRx. Photo T. Dinot



- 1 : Spores elliptiques, 7-9 x 4-5 µm.
2 : Chrysocystides fusiformes à lagéniformes et ventrues, sommet étiré, 30-55 x 10-15 µm.

Débris ligneux

1

Bois mêlés

Fréquent

Chapeau au diamètre de 5-8 cm, visqueux, convexe et ensuite plat, mais obtusément mamelonné. D'abord bleu vert foncé, il se décolore en bleu vert pâle ± jaunâtre. La marge est longtemps appendiculée de nombreux flocons blancs, englués dans le mucus. Les lames, d'abord blanc-rosé passent au gris violacé; leurs arêtes sont givrées de blanc. Le pied, orné de squamules fibrieuses blanches, montre un anneau membraneux bien formé mais fragile, blanc bleuté.

Dans la litière de conifères mêlés de feuillus.
Aire des Chênaux. Maille 3022D24, le 26 novembre 2018.

► La Strophaire vert de gris peut-être confondue avec la Strophaire bleue (*S. cyanea* = *S. caerulea*), mais cette dernière en diffère par son anneau à peine marqué, son voile moins abondant et l'arête des lames de la même couleur que les faces (poils d'arête absents).