

# ► *Hymenopellis radicata* (Relhan) R.H. Petersen



Leg & det. RRx.

Bois



1



2



3

1 : Spores lisses, ellipsoïdes ou ovoïdes, hyalines, guttulées, 13-16,5 x 9-11 µm.  
2 : Cheilocystides fusi-formes-ventrues. 80-110 x 20-30 µm.  
3 : Revêtement piléique formé d'hyphes globuleuses à parois ± épaissies.

Feuillus

Lorsqu'elle est récoltée avec sa longue racine, la reconnaître est facile. Mais parfois celle-ci casse ou est trop courte, alors le chapeau ridé, visqueux, les lames espacées et un pied coriace permettent de l'identifier. Un autre de ses caractères particuliers est de présenter des variations considérables de taille.

Dans la litière, sur bois enfoui, surtout de hêtre.  
Fontaine de Jouvence, maille 3022D21, le 31 août 2018.

Fréquent

► Cette espèce très courante pourrait être confondue avec *Mucidula mucida*, qui affectionne également les hêtres, mais celle-ci, outre le chapeau, a aussi le pied visqueux. *Oudemansiella pudens*, non visqueuse, a le pied finement velouté par la présence de poils ras. Une variété : *Oudemansiella mucida* var. *marginata* présente une ponctuation brun-noir sur l'arête des lames.