




1



2

1 mm

Leg. AG & det. AG

1 : Spores 9-12 x 7,5-10 μ m, largement elliptiques à globuleuses, hyalines, lisses.

2 : Poils 130-160 x 4-5 μ m, brun jaune à la base et se décolorant pour finir hyalin aux extrémités, recouverts de cristaux non solubles à la potasse.

Basidiomes cyphelloïdes de 1 à 2 mm de diamètre, recouverts sur la face externe de poils brun-jaunes très denses, et à hyménium crème à ocre pâle, grégaires, cupuliformes résupinés .

Sur branches mortes de genévrier en pelouse calcaire.

Messigny, Pelouse d'Arvaux, maille 3022D22, le 15 novembre 2022.

► C'est une espèce récemment créée (septembre 2022). L'auteur, un jeune mycologue jurassien talentueux, après avoir fait plusieurs récoltes, l'a retrouvé dans la région fin 2020 et a décrit cette espèce l'année suivante. Elle ne se trouvera que dans sa niche écologique, branches mortes ou mourantes de genévrier, et repérer les espèces qui partagent cette niche peut être un bon indice pour le trouver : *Mycena juniperina* en tête, ou encore *Marasmiellus margaritifer*, *Holmiella sabina*, et ici, mais beaucoup plus petit, *Actidium nitidum*.

Genévrier

Ecorce

Rare