

19/09/2021

Sortie aux étangs de Cîteaux et Bois de la Grange Neuve – Villebichot Forêt de Feuillus, humide

Détermination le soir à la MdA : J.Claude, Denis, Maryse, Henri, Paule

Sur bois mort (branches, écorces, enterré) :

- *Phleogena faginata* petit Basidiomycète < 1cm, basidiomes pédicellés à tête ± sphérique, pouvant être confondu avec un Myxomycète du genre *Diderma* odeur de Bouillon cube
- *Xerula pudens* Collybie à poils ras : lames blanches, long pied brun beige très velouté
- *Pluteus salicinus* Plutée du saule : chap.gris fibrilleux
- *Pluteus leoninus* Plutée jaune lion : chap.feutré jaune citron
- *Pluteus cervinus* Plutée couleur de cerf : odeur de radis NB : les plutées ont des lames roses, fines, serrées
- *Pholiota curvipes* Pholiote à pied courbe chap.3 cm jaune
- *Panellus stipticus* (*Crepidopus*) : pied court latéral, chap;3 cm, crème, lames inter-veinées
- *Steccherinum bourdotii* résupiné, chap.en disque mince zoné velouté orange, hyménium à aiguillons
- *Simocybe* sp.
- *Ramaria stricta* Clavaire ou Ramaire dressée droite, crème jaune rose la seule qui vient sur le bois
- *Cerioporus squamosus* Polypore écailleux
- une belle croûte à déterminer

Autres :

- *Amanita excelsa* var. *valida* pied cassant qui brunit NB : *A.spissa* odeur de rave ; *A.excelsa* odeur de gant de toilette qui sèche
- *Russula laurocerasi* R.laurier cerise: jaune orange maculé de brun rouge vineux, surface collante, bord strié, odeur d'amande amère
- *Russula faginea* R.écrevisse des hêtres : rouge brun visqueux au centre, odeur de poisson
- *Russula pelargonina* det.PhC odeur de f.froissées de géranium ou de compote de pomme, sous trembles
- *Lactarius acris* det.PhC chap.lilas violacé, chair devenant vite rose à la coupe et orange dans le pied, sous les hêtres
- *Cortinarius raphanoides* groupe des hinnulei odeur de radis, brun olivâtre, sous les bouleaux
- *Cortinarius sobrius* groupe des C.largus, gris bleuâtre, lames un peu bleu violet,mais teinte très claire, pied creux sous les bouleaux
- *Inocybe* sp.
- *Typhrasa gossypina* Psathyrelle à chap brun rougeâtre un peu cabossé, voile
- *Psathyrella candolleana* P.de De Candolle chap.beige clair à blanchâtre, lames blanc→gris violet→brun
- *Mycena leptcephala* odeur pétales de coquelicot
- *Leotia lubrica* Léotie visqueuse, Ascomycète qui pousse en troupe sous les feuillus des forêts humides chap. brun jaune, pied jaune
un exemplaire vert car parasité par un champignon : *Hypomyces leotiicola*

Apports :

Maryse : *Clitocybe alexandri* = *Clitopaxillus alexandri* pied trapu, chap ;

Henri : Velars

- *Cortinarius praestans*
- *Tricholoma columbetta*
- *Entoloma lividum*
- *Russula lipida* rouge, gros pied dur
- *Russula nigricans*
- *Scleroderma* sp.
- *Collybia platyphylla*
- *Oligoporus tephroleucus* = *Postia tephroleuca* Polypore blanc, bosselé, en console largement fixée au substrat