

11/10/2021 SMCO

**Forêt domaniale de Mantuan** altitude 500m départ depuis Concoeur  
Feuillus (chênes, hêtres, charmes)-Conifères (épicéas, sapins, pins)  
sur calcaire des Hautes Côtes

environ 60 espèces

Sortie : 15 participants

MdA : 12 participants CR : Paule

*Boletus pseudoregius*

*Lactarius deliciosus*

*Lactarius salmonicolor*

*Lactarius sanguineus*

*Lactarius pallidus*

*Lactarius uvidus*

sous Abies, scrobicules orangé-rouge sur stipe

lait blanc immuable, uniquement sous hêtres

lait abondant blanc → violet, chap. visqueux gris lilacin à beige rosâtre

*Lactarius quietus*

*Lactarius cimicarius*

lait à odeur de punaise des bois, chap. rouille en creux, lames crème rosé, sous feuillus

*Lactarius intermedius*

lait jaune, grande taille

*Russula cavipes*

odeur de compote de pomme, stipe creux

*Pluteus pouzarianus*

*Pluteus cervinus*

*Pluteus sp.*

chap. brun noir, sur souches Conifères

*Agaricus sylvicola*

jaunit nettement au toucher, bl. crème, odeur anisée, anneau ample descendant, très bon comestible (on peut confondre avec A. jaunissant à rejeter)

*Agaricus impudicus*

rougit beaucoup et notamment sur les lames froissées, chap. couvert de mèches brun-rouge, odeur de caoutchouc.

*Amanita echinocephala var. subbeillei*

blanche, pas de volve, pied robuste bulbeux, grandes verrues pyramidales, c'est une méridionale !

*Macrolepiota fuliginosa*

Lépiote élevée, chap. blanc crème, pied rose vineux au grattage grosses squames brunes sur le chapeau, anneau épais.

*Hymenopellis radicata (Xerula radicata = Oudemansiella radicata)* Collybie radicante

*Mycena pura*

odeur forte de radis

*Mycena pelianthina*

lames lilas pâle à arête plus foncée, violette ou pourpre

*Tricholoma saponaceum*

odeur de savon

*Tricholoma imbricatum*

chap. brun fibrilleux, mamelonné, sous pins uniquement

*Tricholomopsis rutilans*

lames jaune soufre, chap. rouge purpurin, sur souches de Conifères, souvent en touffes

*Melanoleuca melaleuca*

Tricholome noir et blanc, endroits herbeux

*Lepista sordida*

chap. et stipe lilas violacé, lames facilement séparables

*Lyophyllum pseudosinuatum*

chap. gris, pied renflé, lames bleuissantes à noir au toucher

*Laccaria amethystina*

tout violet, lilas en séchant

*Tephroclybe osmophora*

blanc grisâtre, petite taille, odeur fruitée

<i>Clitocybe nebularis</i>	toxique
<i>Clitocybe alexandri</i>	chap. beige-brun, lames adnées un peu décourantes, odeur de chocolat
<i>Clitocybe candicans</i> (= <i>gallinacea</i> )	petit, blanc, odeur de terre, toxique
<i>Cortinarius bulliardii</i>	chap. brun rouge, base du pied d'un beau rouge cinabre
<i>Cortinarius infarctus</i>	visqueux gris brun → gris olivâtre → ochracé au centre
<i>Cortinarius atrovirens</i>	très beau cortinaire : stipe jaune un peu fluo, bulbeux, chap. très sombre vert olive noir
<i>Cortinarius meinhardii</i>	jaune, pied à bulbe marginé, chair jaune d'or intense sous Conifères
<i>Cortinarius torvus</i>	
<i>Cortinarius suillus</i>	C. des porcs, brun crème à saumon, lames et stipe +/- mauves
<i>Cortinarius bivelus</i>	brun crème, voile laissant un anneau irrégulier, sous les bouleaux
<i>Cortinarius venetus</i>	chap., stipe et mycélium jaune ou brun olivacé, odeur d'herbe, de persil
<i>Cortinarius amoenolens</i>	odeur de mirabelle, jaune ochracé +ou- olivâtre ou bleu bulbe arrondi, chair parfois bleue, surtout sous hêtres
<i>Cortinarius talus</i>	
<i>Cortinarius platypus</i>	
<i>Cortinarius nanceiensis</i> var. <i>bulbopodium</i>	lames jaunes, voile violet pourpre
<i>Cortinarius piceae</i>	
<i>Cortinarius decipientoides</i>	
<i>Hypholoma fasciculare</i>	très commun, en touffe sur les souches. Toxique.
<i>Coprinopsis picacea</i> = <i>Coprinus picaceus</i>	le coprin pie
<i>Hohenbuehelia geogenia</i>	Pleurote terrestre, sous feuillus sur bois enterré, chap. bl. brun gris, lames blanc crème fourchues près du pied, sur sol en relation avec du bois. Comestible.
<i>Hydnum repandum</i>	Pied de mouton, blanc crème, aiguillons, bon comestible
<i>Hydnum rufescens</i>	Pied de mouton jaune-orangé-roux, aiguillons crème, com.
<i>Calocera viscosa</i>	jaune et très visqueuse
<i>Ramaria aurea</i>	fait partie des ramaires comestibles mais facile à confondre avec les purgatives !
<i>Ramaria pallida</i>	
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Vesse de loup perlée, très courante
<i>Calvatia excipuliformis</i> = <i>Lycoperdon excipuliformis</i>	grosse Vesse de loup à verrues non pyramidales
<i>Geastrum rufescens</i>	ouvert en étoile à branches brun rouille
<i>Geaster</i> sp.	de + petite taille avec le « sac à spores » pédonculé
<i>Oligoporus caesius</i>	Polypore bleuté des Conifères, chair molle bleutée, sur bois mort
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	Polypore ou Tramète cinabre, bel orangé rouge intense en console, sporée blanche ! Pousse sur bois mort de hêtre