



# ► *Coprinopsis echinospora*

(Buller) Redhead, Vilgalys & Moncalvo



1 : Spores lenticulaires, utriformes ou mitriformes, grossièrement verruqueuses, brun rouge foncé, avec pore germinatif très prononcé.

2 : Basides clavées ventrues, tétrasporiques, non bouclées. Cheilocystides vésiculeuses à piriformes. Pleurocystides fusiformes cylindriques.



Leg. JCV & dét. JCV

Tronc mort

Feuillus

Rare

Chapeau cylindrique au début, puis aplani étalé; surface recouverte, dans la jeunesse, d'un voile blanc fibrilleux floconneux facilement détersile sur fond gris souris à brun olive, glabrescent avec l'âge et beige à gris foncé, strié radialement, centre gris brun; marge d'abord ornée du voile blanc fibrilleux, frangée dans la vieillesse, finalement récurvée.

Dans l'infarctuosité d'un arbre mort, récemment abattu par le vent.  
Combe Saint-Martin, maille 3023D12, le 12 avril 2018.

Première mention côte-d'orienne

► Six espèces de coprins à spores verruqueuses sont recensées en Europe; on pourrait confondre *C. echinospora* avec *C. phlyctidospora*, sur places à feu, et à pore germinatif bien plus petit, et qui possède également des basides tétrasporiques.