



► *Pyronema domesticum* (Sowerby) Sacc.



Leg. JCV & det. JCV

Pelouse



- 1 : Spores ovales à (sub)ellipsoïdes, lisses, non guttulées, hyalines, 15-21 x (7)9-12(13,5) µm.
 2 : Asques à 8 spores, non amyloïdes, 166-170 µm.

Place
à feu

Apothécie jusqu'à 05-1 mm de diamètre, arrondie ou lenticulaire lorsque solitaire, irrégulière lorsque agrégée, reposant directement sur un subiculum mycélien blanc. Hyménophore rose pâle à saumoné. Excipulum medulla en *textura globosa*, formé de cellules rondes, piriformes à allongées. Poils marginaux fins, hyalins, pointus.

Sur une place à feu très discrète.

Brochon, Champ Sement, maille 3023D21, le 4 juin 2018.

Peu
fréquent

► *P. domesticum* se caractérise par ses apothécies souvent individualisées, à marge pourvue de poils hyalins, ses spores (13)15-19(21) x (7)9-12(13,5) µm. *P. omphalodes* diffère par ses apothécies non individualisées mais formant des plaques, l'absence de poils marginaux ou alors très discrets, ses spores 10-15(16,5) x (5)6-9(11)µm.