



► *Gymnopus inodorus* (Pat.) Antonín & Noordel.



Leg. JCV & det. JCV



- 1 : Spores 7-8 x 3,2-3,5 µm, elliptiques à subfusiformes, uniguttulées, lisses.
- 2 : Cheilocystides obovales, utriformes ou lagéniformes 30-50 x 15-20 µm.
- 3 : Epicutis filamenteux. Pigment membranaire zébrant et boucles nombreuses.

Chapeau 1,8-2,5 cm, plan convexe, marge entière, striée par transparence jusqu'aux trois-quarts à l'état imbu. Revêtement hygrophane, brun roux puis brun ochracé, à marge beaucoup plus pâle. Stipe 2-4 x 0,2-0,3 cm, subégale ou plus dilaté à l'apex, fistuleux à +/- creux, à surface sèche, entièrement pruineuse et le tiers inférieur brun rougeâtre à brun noir, le reste concolore au chapeau. Chair fragile, plus pâle que la surface, inodore et insipide.

**Sur bois mort, en bordure du sentier.
Combe Saint-Martin, maille 3023D14, le 13 juin 2016.**

► *Gymnopus inodus* est caractérisé principalement, sur le terrain, par son absence d'odeur, il ne peut être confondu, de ce fait, ni avec *Gymnopus brassicolens*, ni avec *Gymnopus foetidus*, qui, tous deux, dégagent une odeur forte de chou pourri.

