




Leg. & det. JCV



Bois mort

Feuillus

Rare

- 1 : Spores largement ellipsoïdales à subsphériques, lisses, gris rose, $5,9-8,9 \times 5-6,6 \mu\text{m}$.
 2 : Cheilocystides lagéniformes, papillées au sommet ou étirées en bec, $40-80 \times 10-30 \mu\text{m}$.
 3 : Cuticule hyméniforme constituée d'éléments clavés, à légère pigmentation brune.

Chapeau 20-30 (40) mm, convexe à aplati étalé, un peu déprimé au centre; surface lisse, mate, brun foncé au milieu. Chair blanche à gris brun clair, mince. Lames d'abord blanchâtres, puis gris rose à rose brunâtre, larges, libres ; arêtes blanches. Pied 30-50 x 3-6 mm, cylindrique, creux; surface blanche à gris blanc pâle, recouverte de légères fibrilles blanchâtres.

Sur une branche morte moussue, à terre.
 Combe Chaudron, maille 3023D23, le 15 août 2018.

Première
mention
côte-
d'orienne

► Cette espèce est macroscopiquement très proche de *P. cinereofuscus*. Elle se différencie surtout par les cystides terminées en bec. Des cystides semblables sont aussi produite par *P. thomsonii*, mais cette dernière espèce en diffère par une structure cuticulaire différente.