


Leg. &amp; det. JCV

Litière



1

2

1 : Spores 11-15 x 5-6 µm, jaune verdâtre.  
 2 : Revêtement piléique en trichoderme, à articles terminaux parfois sphériques ou renflés, x 10- 50 µm, donnant un aspect pouvant être hyménodermique, voire épithélial.

Feuillus

Chapeau 5-12 cm, sec, glabre, cabossé-martelé cérébriforme, brun fauve roussâtre à chamois rosé, parfois plus terne à beige grisâtre, souvent marbré. Pores jaunes à jaune olivacé, immuables. Stipe 7-15 x 1-4 cm, radicant, flexueux ou courbé, non réticulé, blanchâtre puis jaunâtre, lavé de roussâtre à brunâtre et parfois avec un cerne roussâtre vineux vers le haut. Chair citrin pâle ou blanche, parfois roux vineux dans les blessures. Saveur douce. Odeur iodée assez forte.

Sous les charmes, dans le bois.

Entrée Combe Chaudron, maille 3023D23, le 25 août 2018.

Peu  
fréquent

► Assez récemment séparé de *B. impolitus* (= *Hemileccinum impolitum*) qui se distingue par un chapeau velouté à feutré filamentueux, gris-beige à tonalités verdâtres, rosâtres ou brunes et par un stipe plus droit et robuste.