



Leg. JCV &amp; det. JCV

Bois mort

- 1 : Spores  $5,5-8 \times 5-5 \mu\text{m}$ , elliptiques, à pore germinatif net (vers  $0,5-1 \mu\text{m}$ ).  
 2 : Cheilocystides  $20-55 \times 5-10 \mu\text{m}$ , cylindro-lagéniformes ou fusoïdes ventrues.  
 3 : Chrysocystides, dispersées, subventrues, mucronées ou non,  $36 \mu\text{m} \times 12 \mu\text{m}$ .

Feuillus

Chapeau 3-10 cm, garni à la marge de flocons jaunâtres ; sec, brun-rouge brique, pâlissant jusqu'à roux orangé. Lames blanchâtres puis grises avant de virer au gris purpurin foncé. Chair amère. Stipe 5-12 x 0,4-1,5 cm, souvent courbé, blanchâtre puis jaunâtre à ochracé ou brunâtre par la base. Cortine assez étroite et fugace, se colorant par le dépôt des spores.

Sous une souche de feuillus.

Combe Saint-Martin, maille 3023D14, le 5 avril 2019.

Très fréquent

L'Hypholome rouge-brique est le plus robuste des trois hypholomes. Sa légère amertume le distingue d'*H. fasciculare*, très amer et d'*H. capnoides*, nettement doux. La couleur des lames constitue aussi un bon critère de détermination. Confusion facile avec certains exemplaires robustes et colorés d'*H. fasciculare*.