► *Echinoderma asperum* (Pers.) Bon

Leg. JCV & det. JCV



1 : Spores subfusiformes à cylindro-elliptiques, parfois à base tronquée, 8,5-10,5 x 3-4 µm.
2 : Cheilocystides sphéropédonculées.

Libère

Feuillus

Peu fréquent

Chapeau 10-12 cm, campanulé à conico-convexe, couvert d'écailles dressées et pointues, bistre roussâtre sur fond fauvâtre à ocre. Lames très serrées, fourchues, blanches puis crème sale. Stipe fibrilleux à pelucheux sous un anneau crème membraneux et ample, garni d'écailles brunes vers la marge, 8-12 x 1-2 cm, blanchâtre en haut, brun ocracé sous l'anneau. Chair blanc crème, odeur forte, fruitée.

Sous feuillus, dans la montée vers le Champ Sement.
Combe de Brochon, maille 3023D21, le 30 septembre 2017.

► La Lépiote à lames fourchues se reconnaît bien à ses verrues épineuses et à ses lames remarquablement serrées et fourchues en allant vers le bord du chapeau. *E. calcícola* lui ressemble, mais son chapeau et son pied sont couverts de verrues épineuses persistantes, et non labiles, et ses spores sont beaucoup plus petites (4-6 x 2,5-3,5 µm).