


Leg. JCV & det. JCV



Lieux humides

Mousses

Fréquent

1 : Spores 9-10,5 x 5-4 µm, fusiformes, non amyloïdes. 2 : Cheilocystides, 15-50 x 5-8 µm, fusiformes ou clavées à sublagéniformes. Pleurocystides, rares, semblables.

Chapeau 2-8 mm (parfois minuscule), hémisphérique puis en cloche, finement pruineux, lisse ensuite, orangé vif, pâlissant jusqu'à jaune ou même blanchâtre à la marge. Lames étroitement adnées, peu serrées, blanches ou jaunâtre pâle. Stipe 1-5 cm x 0,2-1 mm, fragile, très fin, jaune orangé à jaunâtre, pâlissant.

Sur débris végétaux, sortant de la mousse humide.
Marais de Jouvence, maille 3022D21, le 8 juin 2017.

► *M. oregonensis*, d'origine américaine, à chapeau rouge orangé ou orangé vif (couleur semblant persister jusqu'à la fin alors qu'elle passe assez vite chez *M. arirula*) lui ressemble. Ses lames peuvent être bordées de jaune ou d'orange pâle. Ses spores sont plus trapues (un peu plus courtes, un peu plus larges). A rechercher en Côte-d'Or.