




Leg RRx & det RRx



Litière



Feuillus



Fréquent

1 : Spores 8-11,6 x 7-9,5 µm, à verres épineuses assez robustes mais souvent obtuses.
 2 : Cystides fusoïdes, atténuées et souvent pointues, 70-100 x 8-15 µm, noircissant assez peu dans les réactifs sulfo-aldéhydiques.

Chapeau 8-20 cm, subglobuleux puis convexe, sec et mat, pruineux, ridulé concentriquement vers le bord, panaché de rouge vineux. Lames plus espacées avec l'âge, crèmes puis jaune ochracé. Arête parfois soulignée de rouge vers la marge. Stipe 6-12 x 2-4 cm, cassant, ridulé ou pointillé, rose lilas, au moins en haut, un peu jaunissant par la base. Saveur douce.

Sous feuillus, surtout sous hêtres.

Source du Rosoir, maille 3022D21, le 13 juin 2018.

► *R. olivacea* se caractérise par l'épicutis remarquablement homogène ne comprenant ni dermatocystides, ni hyphes primordiales incrustées. Enfin, la réaction au phénol, couleur de «mûre écrasée» achève de faire de cette russule l'une des plus caractéristiques du genre. Bien que toutes les russules douces soient supposées comestibles, *Russula olivacea* semble faire exception puisque des intoxications assez graves lui ont été imputées.