


► *Trametes gibbosa* (Pers.) Fr



Leg. & det. RRx



1

2

1 : Spores cylindriques elliptiques, lisses, hyalines, parfois guttulées, 4- 5,5 x 2-2,5 µm.
 2 : Pores de la surface hyméniale allongés radialement séparés par des parois assez épaisses.



En forme de console finement veloutée, le Tramète bossu, doit son nom à une protubérance épaisse typique bien visible à son point d'insertion. Blanc dans la jeunesse, il devient jaune brunâtre et se retrouve vite envahi par des algues qui le colorent en vert. Cette espèce est relativement variable quant à sa forme et sa couleur. On le rencontre toute l'année, isolé ou en troupes d'individus étagés ou imbriqués. Saprophyte, très rarement parasite.

Sur bois mort de feuillus, en particulier sur souches de hêtre.
 Fontaine de Jouvence, maille 3022D21, le 15 octobre 2015.



► Il n'est pas consommable de par sa consistance tenace et élastique. De plus, sa chair est amarescente au goût. La confusion avec *T. hirsuta* est assez courante, mais un simple examen de la face inférieure fertile dissipe le doute : *T. gibbosa* a des pores allongés radialement prenant souvent un aspect lamellé sous la bosse alors que *T. hirsuta* présente toujours des pores ronds et fins.