




► *Hohenbuehelia grisea* (Peck) Singer



Leg. JCV & det.JCV



- 1 : Spores 6,5-8 (9) X 4-4,8 µm, cylindracées à elliptiques, parfois un peu réniformes.
 2 : Cheilocystides 15-28 X 4-9 µm, un peu lécythiformes, rarement ramifiées, terminées par une boule de mucus (gliosphex).
 3 : Cystides métuloïdes 40-75 X 10-14 µm, fusiformes et incrustées au sommet.



Chapeau 0,8-1,3 cm, hygrophane, gris à brunâtre olive, surmonté d'une pellicule gélatineuse; lames plus ou moins espacées (5 à 13 grandes lames), blanches à jaune pâle, ne noirissant pas; pied nul ou très réduit. Saveur fortement farineuse. Odeur farineuse.



Sur tronc mort de pin, en bordure du sentier.
 Pelouse d'Arvaux, maille 3022D22, le 26 novembre 2018.

► *H. grisea* est une rare espèce caractérisée par son chapeau grisâtre réniforme, ses lames espacées, son cutis avec un pigment incrustant zébrant, ses basides tétrasporiques. *H. fluxilis* se différencie par ses basides bisporiques, et ses cheilos un peu plus grandes et plus ramifiées.